

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$.
2. Rút gọn biểu thức sau: $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$.

Câu 2. (4,0 điểm)

1. Giải phương trình sau:
- 2.

$$(2x^2 + x - 2013)^2 + 4(x^2 - 5x - 2012)^2 = 4(2x^2 + x - 2013)(x^2 - 5x - 2012)$$

2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = y^3$.

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Tìm đa thức $f(x)$ biết rằng: $f(x)$ chia cho $x + 2$ dư 10, $f(x)$ chia cho $x - 2$ dư 24, $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư.
2. Chứng minh rằng:

$$a(b - c)(b + c - a)^2 + c(a - b)(a + b - c)^2 = b(a - c)(a + c - b)^2$$

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: $AC = 2EF$.

3. Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 5. (2,0 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng :


$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TOÁN 8

Bản hướng dẫn chấm có 04 trang

Câu 1	Hướng dẫn giải	(4.0 điểm)
1 (2.0 điểm)	Ta có $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013$ $= (x^4 - x) + 2013x^2 + 2013x + 2013$	0,5
	$= x(x-1)(x^2 + x + 1) + 2013(x^2 + x + 1)$	0.5
	$= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 2013)$	0.5
	Kết luận $x^4 + 2013x^2 + 2012x + 2013 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 2013)$	0.5
2 (2.0 điểm)	ĐK: $\begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 2 \end{cases}$	0.25
	Ta có $A = \left(\frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{8 - 4x + 2x^2 - x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$	0.25
	$= \left(\frac{x^2 - 2x}{2(x^2 + 4)} - \frac{2x^2}{4(2 - x) + x^2(2 - x)} \right) \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2} \right)$	0.25
	$= \left(\frac{x^2 - 2x}{2(x^2 + 4)} - \frac{2x^2}{(x^2 + 4)(2 - x)} \right) \left(\frac{(x+1)(x-2)}{x^2} \right) = \left(\frac{x(x-2)^2 + 4x^2}{2(x-2)(x^2 + 4)} \right) \left(\frac{(x+1)(x-2)}{x^2} \right)$	0.5
	$= \frac{x^3 - 4x^2 + 4x + 4x^2}{2(x^2 + 4)} \cdot \frac{x+1}{x^2} = \frac{x(x^2 + 4)(x+1)}{2x^2(x^2 + 4)} = \frac{x+1}{2x}$	0.5
	Vậy $A = \frac{x+1}{2x}$ với $\begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 2 \end{cases}$.	0.25
Câu 2		(4.0 điểm)
1 (2.0 điểm)	Đặt: $\begin{cases} a = 2x^2 + x - 2013 \\ b = x^2 - 5x - 2012 \end{cases}$	0.25
	Phương trình đã cho trở thành: $a^2 + 4b^2 = 4ab \Leftrightarrow (a - 2b)^2 = 0 \Leftrightarrow a - 2b = 0 \Leftrightarrow a = 2b$	0.5
	Khi đó, ta có: $2x^2 + x - 2013 = 2(x^2 - 5x - 2012) \Leftrightarrow 2x^2 + x - 2013 = 2x^2 - 10x - 4024$	0.5
	$\Leftrightarrow 11x = -2011 \Leftrightarrow x = \frac{-2011}{11}$.	0.5
	Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{-2011}{11}$.	0.25
2 (2.0 điểm)	Ta có $y^3 - x^3 = 2x^2 + 3x + 2 = 2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} > 0 \Rightarrow x < y$ (1)	0.5
	$(x+2)^3 - y^3 = 4x^2 + 9x + 6 = \left(2x + \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{15}{16} > 0 \Rightarrow y < x+2$ (2)	0.5

	Từ (1) và (2) ta có $x < y < x+2$ mà x, y nguyên suy ra $y = x + 1$	0.25
	Thay $y = x + 1$ vào pt ban đầu và giải phương trình tìm được $x = -1$; từ đó tìm được hai cặp số (x, y) thỏa mãn bài toán là: $(-1 ; 0)$	0.5
	KL	0.25
Câu 3		(4 điểm)
1 (2.0 điểm)	Giả sử $f(x)$ chia cho $x^2 - 4$ được thương là $-5x$ và còn dư là $ax + b$. Khi đó: $f(x) = (x^2 - 4).(-5x) + ax + b$	0.5
	Theo đề bài, ta có: $\begin{cases} f(2) = 24 \\ f(-2) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 24 \\ -2a + b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{2} \\ b = 17 \end{cases}$	0.5
	Do đó: $f(x) = (x^2 - 4).(-5x) + \frac{7}{2}x + 17$	0.5
	Vậy đa thức $f(x)$ cần tìm có dạng: $f(x) = -5x^3 + \frac{47}{2}x + 17$.	0.5
2 (2.0 điểm)	Ta có: $a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 - b(a-c)(a+c-b)^2 = 0$ (1) Đặt: $\begin{cases} a+b-c = x \\ b+c-a = y \\ a+c-b = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{x+z}{2} \\ b = \frac{x+y}{2} \\ c = \frac{y+z}{2} \end{cases}$	0.25
	Khi đó, ta có:	
	$VT_{(1)} = \frac{x+z}{2} \left(\frac{x+y}{2} - \frac{y+z}{2} \right) \cdot y^2 + \frac{y+z}{2} \left(\frac{x+z}{2} - \frac{x+y}{2} \right) \cdot x^2 - \frac{1}{4}(x+y)(x-y) \cdot z^2$	0.5
	$= \frac{x+z}{2} \cdot \frac{x-z}{2} \cdot y^2 + \frac{y+z}{2} \cdot \frac{z-y}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{4}(x^2 - y^2)z^2$	0.5
	$= \frac{1}{4}(x^2 - z^2) \cdot y^2 + \frac{1}{4}(z^2 - y^2) \cdot x^2 - \frac{1}{4}(x^2 - y^2) \cdot z^2$	0.25
	$= \frac{1}{4}(x^2 - y^2) \cdot z^2 - \frac{1}{4}(x^2 - y^2) \cdot z^2 = 0 = VP_{(1)} \quad (\text{đpcm})$	0.25
	KL:....	0.25
Câu 4		(6 điểm)

1 (2.0 điểm)	 Ta có $\widehat{DAM} = \widehat{ABF}$ (cùng phụ $\widehat{BAH}$) $AB = AD$ (gt) $\widehat{BAF} = \widehat{ADM} = 90^\circ$ (ABCD là hình vuông) $\Rightarrow \triangle ADM = \triangle BAF$ (g.c.g) $\Rightarrow DM = AF$, mà $AF = AE$ (gt) Nên. $AE = DM$ Lại có $AE \parallel DM$ (vì $AB \parallel DC$) Suy ra tứ giác AEMD là hình bình hành Mặt khác. $\widehat{DAE} = 90^\circ$ (gt) Vậy tứ giác AEMD là hình chữ nhật	0.75 0.5 0.5 0.25
2 (2.0 điểm)	Ta có $\triangle ABH \sim \triangle FAH$ (g.g) $\Rightarrow \frac{AB}{AF} = \frac{BH}{AH}$ hay $\frac{BC}{AE} = \frac{BH}{AH}$ ($AB=BC, AE=AF$) Lại có $\widehat{HAB} = \widehat{HBC}$ (cùng phụ $\widehat{ABH}$) $\Rightarrow \triangle CBH \sim \triangle EAH$ (c.g.c) $\Rightarrow \frac{S_{\triangle CBH}}{S_{\triangle EAH}} = \left(\frac{BC}{AE}\right)^2$, mà $\frac{S_{\triangle CBH}}{S_{\triangle EAH}} = 4$ (gt) $\Rightarrow \left(\frac{BC}{AE}\right)^2 = 4$ nên $BC^2 = (2AE)^2$ $\Rightarrow BC = 2AE \Rightarrow E$ là trung điểm của AB, F là trung điểm của AD Do đó: $BD = 2EF$ hay $AC = 2EF$ (đpcm)	0.5 0.5 0.5 0.5
3 (2.0 điểm)	Do $AD \parallel CN$ (gt). Áp dụng hệ quả định lý ta lét, ta có: $\Rightarrow \frac{AD}{CN} = \frac{AM}{MN} \Rightarrow \frac{AD}{AM} = \frac{CN}{MN}$ Lại có: $MC \parallel AB$ (gt). Áp dụng hệ quả định lý ta lét, ta có: $\Rightarrow \frac{MN}{AN} = \frac{MC}{AB} \Rightarrow \frac{AB}{AN} = \frac{MC}{MN}$ hay $\frac{AD}{AN} = \frac{MC}{MN}$ $\Rightarrow \left(\frac{AD}{AM}\right)^2 + \left(\frac{AD}{AN}\right)^2 = \left(\frac{CN}{MN}\right)^2 + \left(\frac{CM}{MN}\right)^2 = \frac{CN^2 + CM^2}{MN^2} = \frac{MN^2}{MN^2} = 1$ (Pytago) $\Rightarrow \left(\frac{AD}{AM}\right)^2 + \left(\frac{AD}{AN}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2} = \frac{1}{AD^2}$ (đpcm)	0.5 0.5 0.5 0.5
Câu 5 2.0 điểm	Trước tiên ta chứng minh BĐT: Với $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ và $x, y, z > 0$ ta có	2 điểm 0.75

	$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z} \quad (*)$ Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ Thật vậy, với $a, b \in \mathbb{R}$ và $x, y > 0$ ta có $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y} \quad (**)$ $\Leftrightarrow (a^2y + b^2x)(x+y) \geq xy(a+b)^2$ $\Leftrightarrow (bx - ay)^2 \geq 0 \text{ (luôn đúng)}$ Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ Áp dụng bất đẳng thức (**) ta có $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}$ Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$	
	Ta có: $\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} = \frac{\frac{1}{a^2}}{ab+ac} + \frac{\frac{1}{b^2}}{bc+ab} + \frac{\frac{1}{c^2}}{ac+bc}$ Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có $\frac{\frac{1}{a^2}}{ab+ac} + \frac{\frac{1}{b^2}}{bc+ab} + \frac{\frac{1}{c^2}}{ac+bc} \geq \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2}{2(ab+bc+ac)} = \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2}{2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)} \quad (\text{Vì } abc=1)$	0.5
	Hay $\frac{\frac{1}{a^2}}{ab+ac} + \frac{\frac{1}{b^2}}{bc+ab} + \frac{\frac{1}{c^2}}{ac+bc} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$	0.25
	Mà $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3$ nên $\frac{\frac{1}{a^2}}{ab+ac} + \frac{\frac{1}{b^2}}{bc+ab} + \frac{\frac{1}{c^2}}{ac+bc} \geq \frac{3}{2}$	0.25
	Vậy $\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2} \quad (\text{đpcm})$	0.25
	Điểm toàn bài	(20 điểm)